

Biocid

ATAK MikroCif 10 MC

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Přípravek ve formě mikrokapsulovaného koncentrátu, pro ředění vodou (biocidní insekticid – sk.18).

Biologicky účinné látky v přípravku: cyfenothrin, α -cyano-3-phenoxybenzyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanekarboxylát (insekticid ze skupiny umělých pyrethroidů), koncentrace 100 g/litr (10%)

Určení nebezpečnosti chemických látek:

Účinná složka/nebezpečná složka: cyfenothrin (číslo CAS 39515-40-7), koncentrace 100 g/litr (10%), 2-methylisothiazol-3(2 H)-on, 1,2-benzisothiazol-3(2 H)-on

VAROVÁNÍ

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený P234 Uchovávejte pouze v původním balení P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. P273 Zabráňte uvolnění do životního prostředí. P391 Uniklý produkt seberte. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P411 Skladujte při teplotě nepřesahující 30°C. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.

POZOR!

Může ohrozit zdraví při požití, nadýchání a styku s pokožkou a sliznicemi! Přípravek používejte jen podle návodu!

URČENÍ:

ATAK MikroCif 10 MC je přípravek určený pro neprofesionální použití k hubení lezoucího hmyzu (zejména: rusů, švábů, štěnic, mravenců, faraónů, rybenek apod.) při sanitární hygieně. Může být používán v obytných, veřejných, kancelářských, dílenských, skladových, zemědělských prostorách a také v nemocnicích (s výjimkou lůžkových oddělení), mateřských školách a jiných, a to za přísného dodržování bezpečnostních opatření.

NAVOD K POUŽITÍ

Dezinsekční zákroky by se neměly v žádném případě konat v přítomnosti nemocných, dětí, těhotných a kojících žen. Nedoporučuje se používání přípravku v místnostech, ve kterých pobývají staří lidé a alergici. Před aplikací odstraňte potraviny nebo krmivo. Pokud to není možné, potraviny a krmivo pečlivě chraňte před zasažením roztokem přípravku.

Zárok může být prováděn většinou typů postřikovačů používaných k hubení hmyzu v uzavřených prostorách. Základním pravidlem správného provedení zároku je důkladné pokrytí emulze přípravku pro aplikaci dezinfekovaného povrchu (do momentu počátku jejího minimálního stékání).

Hubení lezoucího hmyzu (štěnic, rusů, domácích, švábů apod.) je nutno zvláštní pozornost věnovat místům jejich hnízdění (kouty stěn a podlah, škvíry, štěrby, prostupy trubek a kabelů, místa s lištami, tapetami a obložením, vany, skříňky dřezů, zadní části nábytků a obrazů, digestoře apod.).

Po práci pečlivě umyjte vybavení. Zbytky nespotřebované emulze přípravku pro aplikaci rozřeďte vodou a vystříkejte na dříve postříkané povrchy. Vodu použitou k mytí vybavení vystříkejte na dříve postříkané povrchy za použití stejných osobních ochranných prostředků. Odpady s přípravkem nebo přípravek s prošlou spotřební lhůtou je třeba odstranit dle platných právních předpisů pro nakládání s odpady.

Po uplynutí 24 – 48 hodin od dezinfekce je nutno smýt přípravek z povrchů, se kterými má přímý styk uživatel. Na ostatních plochách přípravek musí zůstat. Po zároku je nutno místnosti vyvětrat.

DÁVKOVÁNÍ:

Doporučená koncentrace roztoku pro aplikaci 2,5 % hmot. (250 ml prostředku na 10 l vody, 50 ml prostředku na 2 l vody).

Jeden litr roztoku pro aplikaci vystačí na postřik cca 20 m² plochy.

Časové období potřebné pro biocidní účinek: **začíná účinkovat po 6-12 hodinách a působí po dobu 2-3 měsíců pokud nebude mechanicky odstraněn (setřený, opláchnutý apod.).**

PŘÍPRAVA ROZTOKU PŘÍPRAVKU PRO APLIKACI

Podle množství připravovaného roztoku přípravku pro aplikaci vypočítejte potřebné množství přípravku. Na 2,05 litrů roztoku přípravku pro aplikaci potřebujete 50 ml přípravku (2l vody + 50 ml přípravku). Do připraveného množství vody v nádrži rozprašovače (postřikovače) (přibližně 1/3 objemu) vlijte vypočtené množství přípravku. Přípravek před odléváním dobře protřepejte. Nádobu postřikovače s vodou po nalití přípravku doplňte na konečný objem a dobře protřepejte a promíchejte až se vytvoří stejnorodý roztok. Takto připravený roztok můžete aplikovat na vybrané povrchy.

Připravenou emulzi pro aplikaci nelze dlouhodobě skladovat. Emulzi pro aplikaci proto použijte ihned po ukončení přípravy.

SKLADOVÁNÍ: P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. P411 Skladujte při teplotě nepřesahující 30°C. Skladovat v zastíněných místech. Zabraňte promrznutí přípravku.

POZNÁMKY:

1. Před provedením dezinsekce vyveďte na dobu zákroku z místnosti lidi a zvířata.
2. Postřik nepoužívejte na žlaby, napáječky a jiné povrchy, se kterými mohou přijít do styku zvířata.
3. Chraňte potraviny, nádobí na potraviny a krmivo před kontaminací přípravkem.
4. Před provedením dezinsekce potraviny a krmiva odstraňte z místnosti nebo pečlivě přikryjte.
5. Postřik nepoužívejte na povrchy přicházející do styku s potravinami.
6. Vyhýbejte se setrvání v dosahu rozprašovaného roztoku přípravku.
7. Zabraňte unášení aerosolu přípravku průvanem.
8. Nepostřikujte dětské postýlky a hračky.
9. Nepostřikujte díly strojů, instalací, elektromotorů apod.
10. Připravený roztok přípravku k aplikaci musí být spotřebován co možná nejrychleji. Nemůže být ponechána na druhý den.
11. Objekt může být předán do užívání po úplném vyschnutí postříkaných ploch a pečlivém vyvětrání.
12. Po práci umyjte důkladně vybavení, umyjte se vodou a mýdlem, vypláchněte ústa a převlékněte oděv.
13. Zbytky roztoku přípravku a vodu použitou na mytí vybavení vystříkejte na plochu ošetřenou při zákroku.
14. Vratný zálohovaný obal. Prázdné obaly od produktu vraťte prodejci nebo výrobci.
15. Jakákoliv množství produktu vznikající v důsledku rozlití nebo úniku je nutno pokrýt sorpčním materiálem (písek, zemina, křemelinová půda apod.) a předat ke zneškodnění odborné společnosti.

LÉKAŘSKÁ POMOC:

V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená v upozorněních, kontaktujte nejbližší Toxikologické středisko: Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2. Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: +420224919293 nebo +420224915402.

UPOZORNĚNÍ:

Je zakázáno využívat prázdné obaly od biocidů k jiným účelům, v tom také nakládání s nimi jako s druhotnými surovinami.

PRVNÍ POMOC:

Při zasažení očí: odstraňte kontaktní čočky. Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí pitné vody po dobu cca 15 minut. Neprodlužte vyhledejte očního lékaře.

Při styku s kůží: Potřísnění kůže, především na citlivých místech, např. v obličeji, může způsobit svědění, pálení nebo brnění. Pokožku ihned oplachujte velkým množstvím vody s mýdlem. Pokud se objeví jakékoliv podráždění pokožky, vyhledejte lékaře.

Při požití: V případě podezření na otravu ihned zavolejte lékaře.

POZOR! Osobám v bezvědomí nepodávejte žádné tekutiny ani jídlo ani nezkoušejte vyvolat zvracení!

Při nadýchání: Osobu se symptomy otravy vdechnutím umístěte na čerstvý vzduch nebo na dobře ventilované místo. Zajistěte, aby nedošlo u ní k podchlazení.

U otrávených osob lze pozorovat: zvýšenou nervozitu, alergické reakce, úzkostné stavy, brnění při doteku, porucha koordinace pohybů (ataxie), křeče.

Při požití je třeba provést výplach žaludku.

Vniknutí přípravku do plic může způsobit příznaky zápalu plic. Postiženou osobu umístěte na čerstvý vzduch nebo na dobře ventilované místo. Provádějte symptomatickou léčbu. Pokud se vyskytnou alergické reakce, léčit antihistaminiky.

PROTILÉK: NEEEXISTUJE, PROVÁDĚT SYMPTOMATICKOU LÉČBU

Výrobce: Asplant-Skotniccy Sp.J. ul. Chopina 78 A 43-600 Jaworzno, Polsko

Dovozce do ČR: Mgr. Miloš Krejsa

Distribuce a balení pro ČR: AgroBio Opava, s.r.o. Mostní Mostní 41/1 Skrochovice 747 71 Brumovice

UPOZORNĚNÍ: JE ZAKÁZÁNO VYUŽÍVAT PRÁZDNÉ OBALY OD BIOCIDŮ K JINÝM ÚČELŮM, V TOM TAKÉ NAKLÁDÁNÍ S NIMI JAKO S DRUHOTNÝMI SUROVINAMI.

Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům neodpovídajícího skladování a použití přípravku. Při dodržení skladovacích podmínek v originálních nepoškozených obalech je doba použitelnosti přípravku 3 roky od data výroby.

Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!

UFI: 3600-Y03H-400G-49Q1 MZDR: 5650/2024/OBP

Obsah: 50ml

Datum výroby a číslo šarže uvedeno na obalu.

Doba použitelnosti: 3 roky