

Přípravek na ochranu rostlin

Před použitím si přečtete příložený návod k použití.

Obchodní název přípravku:

BELLIS

Přípravek se systémovým účinkem určený proti skládkovým chorobám jaderovin, padlí jabloňového, strupovitosti.

Typ přípravku a typ působení přípravku:

Formulační úprava:  
Typ působení přípravku:

ve vodě dispergovatelné granule  
FUNGICID

Kategorie uživatelů:

NEPROFESIONÁLNÍ UŽIVATEL

Název a množství účinné/nebezpečné látky:

boskalid 252 g/kg (25,2 % hmot.)  
pyraklostrobin 128 g/kg (12,8 % hmot.)

Označení přípravku:  
Varování



H302 Zdraví škodlivý při požití. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte prach. P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít. P308+P313 Při expozici nebo podezření n ani: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Držitel povolení: AgroBio Opava, s.r.o. Mostní 41/1 Skrochovice, 747 71 Brumovice

Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za konečné označení přípravku na ochranu rostlin na trhu:  
AgroBio Opava, s.r.o. Mostní 41/1 Skrochovice, 747 71 Brumovice

Evidenční číslo přípravku:

5004 -1

Číslo šarže / datum výroby formulace:

Doba použitelnosti nebo Datum expirace:

uvedeno na obalu  
uvedeno na obalu

Množství přípravku v obalu:

4 g, 8 g, 16 g, 24 g, 32 g v PET/Al/PE nebo PAP/Al/PE sáčku

**Způsob působení:**  
Boskalid je účinná látka ze skupiny anilidů. Působí na dýchací procesy citlivých organismů, avšak v jiném místě metabolismu než strobiluriny. Účinná látka pyraklostrobin je novou účinnou látkou ze skupiny strobilurinů. Účinek je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím přenosu, čímž dojde ke zhroucení celého organismu a je zabráněno sporulaci a klíčení spór. Obě látky působí systémově, vykazují preventivní i kurativní účinek, tzn. že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.

**Návod k použití - Rozsah povoleného použití:**  
**dělitelná balení:**

| 1) Plodina, oblast použití | 2) Škodlivý organismus, jiný účel použití        | Dávkování, místnost      | OL | Poznámka<br>1) k plodině 2) k ŠO<br>3) k OL 4) k dávkování<br>5) Umístění 6) Určení sklizně |
|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| jaderoviny                 | skládkové choroby, padlí jabloňové, strupovitost | 0,08%<br>(8 g/10 l vody) | 7  | 4) do počátku skanutí                                                                       |

**jednorazové balení pro: 4g, 8g, 16g**

| 1) Plodina, oblast použití | 2) Škodlivý organismus, jiný účel použití        | Dávkování, místnost       | OL | Poznámka<br>1) k plodině 2) k ŠO<br>3) k OL 4) k dávkování<br>5) Umístění 6) Určení sklizně |
|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| jaderoviny                 | skládkové choroby, padlí jabloňové, strupovitost | 0,08%<br>(4 g/5 l vody)   | 7  | 4) do počátku skanutí                                                                       |
| jaderoviny                 | skládkové choroby, padlí jabloňové, strupovitost | 0,08%<br>(8 g/10 l vody)  | 7  | 4) do počátku skanutí                                                                       |
| jaderoviny                 | skládkové choroby, padlí jabloňové, strupovitost | 0,08%<br>(16 g/20 l vody) | 7  | 4) do počátku skanutí                                                                       |

OL – (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

| Plodina, oblast použití | Způsob aplikace | Max. počet aplikací plodině v | Interval mezi aplikacemi | Aplikační poznámky:<br>Padlí jabloňové, strupovitost – aplikace při nebezpečí infekce nebo při vydané signalizaci v BBCH 54-85<br>BBCH 54 - fáze myšího ouška<br>BBCH 85 - pokročilé zrání, nárůst intenzity odrůdově specifického zbarvení |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| jaderoviny              | postřik, rosení | 4x za rok                     | 8-14 dní                 |                                                                                                                                                                                                                                             |

**Skládkové choroby** – aplikace před sklizní v BBCH 77-85

**BBCH 77** – plod dosahuje asi 70% konečné velikosti

**BBCH 85** – pokročilé zrání, nárůst intenzity odrůdově specifického zbarvení

K zabránění vzniku rezistence aplikujte tento přípravek preventivně, a ne stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

#### Ochráně vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, nečlověčích organismů a složek životního prostředí:

Při aplikaci přípravku nesmí dojít k zasažení vodních ploch z důvodu rizika pro vodní organismy.

#### Další omezení:

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čochy. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Další práce lze provádět až po důkladném ošetrnutí ošetřených rostlin. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného oděvu a dalších ochranných prostředků a do důkladného umytí. Ochranný oděv vyperte, resp. důkladně očistěte ty ochranné prostředky, které nelze prát. Přípravek uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

#### Osobní ochranné pracovní prostředky:

|                           |                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ochrana dýchacích orgánů: | není nutná                                                                                   |
| Ochrana rukou:            | gumové nebo plastové rukavice                                                                |
| Ochrana očí a obličeje:   | ochranné brýle nebo obličejový štít                                                          |
| Ochrana těla:             | ochranný oděv a nepromokavý plášť nebo turistická pláštěnka                                  |
| Dodatečná ochrana hlavy:  | kapuce, čepice se štítkem nebo klobouk                                                       |
| Dodatečná ochrana nohou:  | ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) s ohledem na práci v zahrádkářském terénu |

Poškozené ochranné prostředky (např. protřené rukavice) je třeba vyměnit. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte. U textilních prostředků se při jejich praní/ošetřování/čištění řiďte piktogramy/symboly, umístěnými zpravidla přímo na výrobku.

#### Informace o první pomoci:

**Všeobecné pokyny:** Projeví-li se zdravotní potíže (vždy při zasažení očí neředěným přípravkem nebo při požití) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.

**První pomoc při nadýchání:** Přerušete práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.

**První pomoc při zasažení kůže:** Odložte kontaminovaný/nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.

**První pomoc při zasažení očí:** Vyplachujte oči alespoň 10 minut velkým množstvím vlahe čisté vody a současně odstraňte kontaktní čochy, jsou-li nasazené, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čochy nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.

**První pomoc při náhodném požití:** Vypláchněte ústa vodou. Podejte, pokud možno cca 5-10 tablet rozdrčeného aktivního uhlí a dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

#### Skladování:

Přípravek uchovávejte v uzavřených originálních obalech, na suchých, chladných, uzamykatelných a dobře větraných místech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při teplotách +5 až +30 °C. Chránit před nadměrným teplem či chladem.

#### Likvidace obalů a zbytků:

Při likvidaci zbytků a použitých obalů nesmějí být zasaženy zdroje spodních a recipienty povrchových vod.

Aplikační kapalinu spotřebujte beze zbytku.

Obaly od přípravku se nesmějí znovu používat k jakýmkoliv účelům!

Případné zbytky přípravku, prázdné obaly a oplachové vody se likvidují jako nebezpečný odpad uložením do vyčleněných kontejnerů na místech vyhrazených k tomuto účelu obecními nebo městskými úřady.

Použité nářadí, nástroje, zařízení a ochranné pomůcky se omyjí se vodou.

#### Další údaje a upřesnění:

Přípravek se nesmí používat pro jiné účely a v jiném rozsahu, než je uvedeno v tomto návodu k použití.

#### Příprava aplikační kapaliny:

Odměřené množství přípravku vsypte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení.

#### Čištění zařízení pro aplikaci přípravku:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikem, musí být veškeré jeho stopy z postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu: **1.** Po vypuštění nádrže vypláchněte nádrž a pistolí čistou vodou. **2.** Zbytek oplachové vody vypustěte a celé zařízení znovu vypláchněte čistou vodou s přídavkem čisticího prostředku (postupujte dle návodu na jeho použití). **3.** Opakujte postup podle bodu „2“ ještě jednou. **4.** Trysky a sítky musí být čistěny odděleně.

Riziko za poškození vyplývající z použití přípravku jinak, než jak je uvedeno v této etiketě nese spotřebitel.

Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.

Přípravky, u nichž prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že jejich chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbor přípravku pro tento účel zajistí držitel povolení u laboratoře akreditované v členském státě Evropské unie. Držitel povolení je povinen prodlouženou dobu použitelnosti vyznačit na obalu přípravku a tuto skutečnost oznámit Ústavu do 5 dnů ode dne provedení změny na obalu přípravku.